

bus in eum modum prodeunt, quo ex thoracis & lumborum uertebis nervi egrediuntur, quum interim ab hominis osse coccyge, ne unus quidem exiliat nervus. Adde sanè ut minimè mirandum sit, si ego à Galeni sententia in libro de Ossibus, & in horum nervorum paribus recensendis procul declinem, quum is suis sectionibus fidens simiarum potius quàm hominum nervos prosequatur: secus ferè atque in libris de Vsu partium, quos ex aliorum sententia multis locis illum cōscripsisse nulli non constat, qui sedulo ipsius loca, ac demum simiæ sectionem hominis sectioni confert. Quinque igitur sacri ossis inferiora paria nervos in posteriora excidentes ad musculos potissimum digerunt, qui illum ossis & sacri ossis posteriorē occupant sedem, ex quorum classe in dextro latere est musculus dorsum mouentium^h undecimus, ac deinⁱ decimus tertius, præter membraneum initium^k musculi brachium ad dorsum humiliora agentis, & quartum humani thoracis motorum. Item^l quatuor primi femur mouentium, ac cutis denique clunibus obducta, quæ ipsa quoque propaginibus aliquot ab illis nervis donatur. Anteriores uerò nervi uariè magis digeruntur. siquidem tres superiores, primi parisi modo in crus (uti subsequenti narrabo Capite) properant. Duo autem humiliores nervi, qui sexti septimiq; parium propagines sunt, in ani musculos digeruntur. ad hæc, in utriusque cervicem frequenti sobole, uti etiam in uirorum uescicæ cervicem penem^m ue, pertinent. Nam uescicæ ac utriusque item fundus plerumqueⁿ nervulos ab illis mutuatur ramis, qui à sexto pari nervorum cerebri costarum radicibus sub tunica costas succingente exporriguntur. Terminus uerò dorsalis medullæ ex sexto sacri ossis osse procidens, nervi ritu mihi haudquaquè digeri uisus est, etiamsi à quibusdam hunc nervum coniuge carentem uocari nō ignorem. In homine tamen, cuius sacrum os quinq; tantū efformari uidebatur ossibus, medullæ dorsalis terminus ab osse procidens unum utriusq; diffundebat surculum, hac ratione sexti parisi sacri ossis uices supplens.

NERVORVM FEMVR, TIBIAM ET
pedem aduentium distributionis ratio. Caput XVII.



Quatuor nervi
uos cruris pe-
teret.

Primi nervi
series.

Secundi nervi
series.

R V R I iuxta femoris initium à dorsum medullæ lumborum uertebis & osse sacro complexæ nervorum paribus, quatuor nervi offeruntur, à reticulari quodammodo plexu perinde procidentes, atq; præcipuos brachium petentes nervos pronasci iam antea relatū est: quanquam magis uariis in ceruice, quàm hic ad lumbos sacrumq; os implexus uisitur. His nervis non eadem obigit crassities, multoq; minus par series & ductus. qui enim primus ac tertius recensentur, graciles sunt. Secundus autem duobus illis crassior subindereperitur, licet interea tenuis quoque sit. quartus uerò illorum trium unā complexorum crassitiem uincit. Primus à suprema parte implexus nervorum in crus per tinentium originem ducit, ubi scilicet tertij lumborum parisi (quod ordine uigessimū secundum est) anterior ramus uigesimo tertio pari commiscetur. Nervus hic lumborum in cumbens^c car nibus, ac peritonæo substratus, in femur procidet secundū exterius latus tendinis^d sexti femur mouentium musculi, qui unā cum septimo femoris motuum autore musculo hæc supra coxendicis os ad^e minorem femoris processum contendit. Simulatq; uerò nervus ille femur contingit^f ramum depromit cuti paulo minus quàm ad genu usque exporrectū, quæ anteriori femoris sedi uersus externū ipsius latus obducitur. Porro^g maior præsentis nervi portio in alto latitans, aliquot propagines deriuat^h primo tibiā mouenti musculo, qui ab antica sede appendicis ilium ossis principiū ducit, dein & septimo tibiā mouenti musculo, qui à maioris femoris processu radice enascitur, mox quoq; inⁱ manū tibiæ motuū autorem, atq; cum illis duobus musculis primi huius nervi grādiōr portio decliuus ducta, elatius quàm genu cōstitat articulus terminatur. Secundus nervus suum principiū inferius quàm primus adipiscitur, è regione uidelicet uigessimū secundi parisi nervorum dorsalis medullæ, seu è regione articulationis tertiæ lumborum uertebæ cum quarta. Hic nervus peritonæi etiā posteriori regioni subtenfus, simul cum^k uena & arteria per inguina femur petentibus in crus porrigitur, ac mox ab interno ipsius latere^l ramum deriuat, uenæ ad pedes usq; pollicem^m attensum, quam ab inguine per internā femoris sedem, ac per genu articulū internamq; tibiæ regionem sub cute ad summū usq; pedem protendi commemorauimus. Atq; ut illa uena uarias soboles in progressu ad cutem illi cōterminā diffundit, ita sanè & hic secundi cruris petentis nervi ramus anteriori uenæ illius sedi toto ductu cōiguus, soboles passim in cutem spargit: inter quasⁿ illa est præcipua, quam anteriori genu regioni offert, in eius sedis cutem frequenti ramorum serie disseminatam. Neque sanè olicitanter obaudiendum est, præsentem ramum anteriori uenæ parti exporrigi, ut in eius uenæ sectione, quam mox sub genu aut iuxta anteriorem malleolum molimur, scalpellum retrorsum atq; in postero

ra impingamus, ne is casu antrorsum actus nervum prui portio simul cum uena ac arteria reconditur, & in mantes quoq; digeritur, præcipue autem inⁱ quintum mouentium, cum quo etiam secundum internum latus sum fertur supra genu articulū, non minus quàm primibranulis uas colligantibus exiguas porrigens soboles. enatus, ubi quarta lumborum uertebra quintæ articula & musculo femur mouentium septimo uectus, ad pubi prorepens. Verum priusquam foramen id superat, no sculis ramulos porrigit: mox uerò & illis musculis, qu censentur. At ubi paulo demissius prorepit, duorum n mum emittit cuti oblatum, quæ internam femoris sedi uiⁱ reliquum ramum offert^h secundo tibiā mouenti m musculi portioni à pubis osse pronatæ ramum deriuat, terminatur. Quartus cruris nervus tertio quidem ortu est, atq; ex uigessimūquinti ac trium succedentium pariu stituitur: non solum omnium nervorum crassissimus medullæ termino principium obtineat, durissimus, par nao quoq; subditus inter sacri ossis latus & ilium os, qu perⁿ sinum ipsi peculiariter paratum ducitur, & mox^o ra quialiquosq; sub^k primo femoris motorum latitans, ta buturus cuti inferiori clunium sedi obtensæ, & illi pari ultra medium longitudinis femoris integit. Cutis enim reposita, ab^l alia quarti nervi propagine ramulos obtine tus nervus hunc ad cutem deprompsit ramum, alias ur sculorum^o capita digerendas, quæ à coxendicis ossis ap tria tibiæ motibus famulantur, ac tertium, quartum & c musculos. Quartum uerò caput femoris motibus pecul tem efformat musculum. Quartus nervus hinc inter mu bi uendicantes reconditus, deorsum fertur, ac paulo sub educit in quarti tibiā mouentis musculi^p partem à fem lus, enatam. Ab hoc ramo propagines in cutem excu ris regionis iuxta genu obductam. Simulatque quartu radicem spectat, utrinque unam edit propaginem, in qui ab inferioribus femoris capitibus enati, tres primi p autem quartus nervus inⁱ sinuⁱ consistit, quem duo infer ficiunt, inⁱ duos crassitie inæquales truncos partitur, à q pedi item nervi offeruntur. Nullus enim in tibiā neru ter^h ramū secundi cruris petentis nervi interiori femoris & Neq; sanè quenquam mirari uelim, quod quartum neru autem (ut Galenus docet) geminus, secundum totam fen rim: quū uniuersus in homine unicā obtineat circumfer mēbrana unguibus dirempta hunc uelut in duos nervos sit negotio, si manū ab ea^l sede, qua prope femoris inferi ad mediam usq; femoris longitudinem duxeris) etiam lic hacratione diuidere: quum is aliud nihil sit, quàm plures culorum protensis, & membranarum circumdati. Ac proinde geminum esse contendet, ego illum decem & octo nervis ipsius portuuncule seu funiculi mihi illos studiose numer tus nervus constet partibus, in poplite, uti prius diceban Exterior, qui & gracilior est, ad fibulæ cum tibiæ osse iu sculis offerendus. Priusquā autem penitus inter musculos diffundit externe cuti tibiæ propriam, ac per exteriorē m tem, atq; in progressu frequentes soboles spargentem. Ip per commemoratam^h edidit propaginem, inter^h septimu sculos primum occultatur, etiam^h sexto pedem mouenti mox in progressu^h ramum educit, qui errabūdo ductu in